

Doença Respiratória Crónica em Ratos e Murganhos

Introdução

A Doença Respiratória Crónica (DRC) é uma infecção comum e complexa que ocorre em ratos e, ocasionalmente, em murganhos. Os animais podem ser infectados logo à nascer e só exibir sinais clínicos mais tarde, à medida que a doença evolui e se agrava. Esta infecção não tem cura completa e, por vezes, tem crises periódicas. O objectivo do tratamento médico é controlar os sinais e sintomas, de forma a que o animal mantenha uma boa qualidade de vida. Juntamente com o seu veterinário, deve definir a melhor estratégia de tratamento para o seu animal.



DADOS IMPORTANTES




- DRC é irreversível e progressiva
- Bactérias (como o Mycoplasma) e vírus estão normalmente envolvidos
- É necessário um tratamento contínuo para DRC

Sinais Clínicos

Os animais afetados podem apresentar infecções do trato respiratório superior ou inferior, infecções de ouvido ou qualquer combinação destas.

Os sintomas do trato respiratório incluem:

- Espirros
- Corrimentos nasal e/ou oculares
- sibilos/crepitações
- “lágrimas” vermelhas (coloração porfirina)
- Dificuldades respiratórias



coloração porfirina

Infecções do ouvido médio ou interno incluem:

- Andar em círculos
- Movimentos anormais dos olhos
- Incoordenação
- Inclinação da cabeça

Outros sintomas incluem

- Diminuição do apetite/perda de peso
- Mau estado da pelagem

Diagnóstico

Exames de diagnóstico

- Exame físico
- Radiografia torácica
- Análises de sangue

Tratamento(s)

O manejo do paciente em casa pode incluir

Melhorias do manejo

- Materiais de cama adequados
- Manutenção do peso ideal
- melhorias na ventilação

Nebulização

Medicações podem incluir:

- antibióticos
- anti-inflamatórios
- Suporte imunitário
- Medicações para ajudar a abrir as vias aéreas e melhorar a respiração

Casos severos podem necessitar de internamento hospitalar e oxigenoterapia

Colaborar com seu veterinário permitirá um melhor plano de tratamento para seu animal de estimação

Perigo de contágio

Esta é uma doença infecto-contagiosa para outros ratos e murganhos, mas isso não significa necessariamente que a separação dos companheiros de gaiola seja necessária. Por favor, fale com seu veterinário sobre o que é melhor para o seu animal de estimação.

Factores de risco

Contacto com outros animais infectados

Mau manejo (cuidado geral do animal)

- Ventilação e saneamento inadequados
- Dieta inadequada

Idade avançada

Imunossupressão

